

❖ آمادگی لازم جهت گرافی مری و

معدة و ترازیت

- ۱- بیمار حداقل ۸ ساعت قبل از انجام آزمون ناشتا باشد.
- ۲- روز انجام گرافی داروهای معده میل نشود.
- ۳- از چند ساعت قبل از انجام گرافی سیگار استعمال ننماید
- ۴- جهت انجام گرافی مری یک بسته ، گرافی مری و معده و اثنی عشر (UGI) دو بسته و ترازیت سه بسته پودر سولفات باریم به همراه بیمار فرستاده شود .
- ۵- زمان تقریبی جهت رادیوگرافی ترازیت ۴ تا ۶ ساعت می باشد .



- ۳- بعد از شام یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی کامل میل نمایند (برای اطفال نصف این مقدار مصرف شود)
- ۴- ساعت ۸ شب ۴ عدد قرص دایمتیکون به فاصله یک ساعت از هم جویده شده و میل نمایند .
- ۵- بعد مصرف داروی های فوق کمی فعالیت بدنی داشته باشند و مایعات ترجیحا گرم فراوان نوشیده شود (از خوردن غذا تا زمان اتمام گرافی خودداری شود)
- ۶- بیمار صبح روز بعد به صورت ناشتا به بخش رادیولوژی مراجعه می نمایند .
- ۷- لباس بیمار باید ساده و بدون پوشش های فلزی باشد .
- ۸- بیمارانی که گرافی IVP دارند به همراه داشتن جواب آزمایش BUN و Cr الزامی قطع شود .
- ۹- در بیماران دیابتی مصرف متفورمین ۴۸ ساعت قبل و بعد از تزریق قطع شود .



آمادگی قبل از انجام سونوگرافی و گرافی ها موضوع مهمی می باشد که برخی از مهمترین آمادگی های لازم قبل از انجام گرافی و سونوگرافی ها که مراجعین محترم حتما باید قبل از مراجعه به کلینیک به آن توجه کنند به شرح زیر بیان می شود .



فهرست پروسیجرهایی (اقدامات) که

نیاز به آمادگی دارند:

❖ آمادگی های لازم جهت انجام گرافی از

شکم ، مهره های کمری و کلیه ها (IVP)

- ۱- از یک روز قبل از انجام گرافی از مصرف غذاهای نفاخ (نخود، لوبیا، عدس، شیر و نوشیدنی های گازدار) پرهیز نمایید .
- ۲- ساعت ۷ شب یک شام ساده میل نمایید (مثل سوپ صاف شده)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
بیمارستان یورسینا

آمادگی های قبل از پروسیجرهای رادیولوژی و سونوگرافی



آموزش به بیمار و سلامت همگانی

(بخش رادیولوژی)

با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :
nkums.ac.ir/category/15413

سونوگرافی

❖ سونوگرافی لکن شامل کلیه ها ، رحم و

تخمندان ها ، پروستات ، بارداری زیر ۴

ماه

۱- نوشیدن مایعات از حدود ۲ ساعت قبل از سونوگرافی و پر بودن مثانه در هنگام مراجعه الزامی است .
۲- خوردن داروهایی که روزانه مصرف می کنید اشکال ندارد.

❖ سونوگرافی بیوفیزیکیال بارداری

-مصرف خوراکی شیرین ۲۰ دقیقه قبل از انجام سونوگرافی (در مادران دیابتی شیر مصرف گردد)

❖ سونوگرافی شکم شامل طحال ، کبد ،

کیسه صفرا و پانکراس و داپلر عروق

کلیه

۱- بیمار ۶ تا ۸ ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا کامل باشد .
۲- خوردن داروهایی که روزانه مصرف می کنید اشکال ندارد .
۳- یک روز قبل از انجام سونوگرافی از مصرف مواد غذایی نفاخ (نخود ، لوبیا ، عدس ، شیر ، نوشیدنی های گاز دار) پرهیز شود .

❖ آمادگی های لازم جهت انجام گرافی

باریم انما

۱- از یک روز قبل از انجام گرافی از مصرف غذاهای نفاخ (نخود، لوبیا، عدس، شیر و نوشیدنی های گاز دار) پرهیز نمایید .

۲- ساعت ۷ شب یک شام ساده میل نمایید. (سوپ صاف شده)
۳- بعد از شام یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی کامل میل نمایند (برای اطفال نصف این مقدار مصرف شود)
۴- ساعت ۸ شب ۴ عدد قرص دایمتیکون به فاصله یک ساعت از هم جویده شده و میل نمایند .

۵- بعد از مصرف داروهای فوق کمی فعالیت بدنی داشته باشند و مایعات ترجیحا گرم فراوان نوشیده شود (از خوردن غذا تا زمان اتمام گرافی خودداری شود)

۶- صبح ۲ ساعت قبل از آمدن به بخش رادیولوژی یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال شود .

۷- بیمار صبح روز بعد به صورت ناشتا به بخش رادیولوژی مراجعه می نمایند .

۸- لباس بیمار باید ساده و بدون پوشش فلزی باشد .

۹- سه بسته پودر سولفات باریم و یک عدد رکتال تیوب شماره ۲۵ به همراه بیمار فرستاده شود .