

تپوی و استفراغ بارداری

در اولین هفته های حاملگی شایع ترین نشانه ای که وجود دارد تپوی و غالباً استفراغ است که هر چند به این اختلال «ناراحتی صحبتگاهی» می گویند ولی می تواند در هر ساعتی از شبانه روز رخ دهد. غالباً این مشکل هنگامی که به مقدار کافی غذای نخورده اید بروز می کند، بنابراین همیشه مقداری غذای سبک مانند بیسکوئیت خشک یا میوه تازه همراه داشته باشید. استفاده از زنجیبل تازه به صورت ماده افزودنی، تپوی را کنترل می کند. از این ماده همچنین می توان به شکل های دیگر مانند چای، اسانس، کپسول، قرص، بسکوئیت و کیک استفاده کرد. از آنجا که حاملگی حس بویایی را افزایش میدهد بعضی از غذاها میتوانند باعث تحریک و آغاز تپوی شوند که نمونه های متداول آن ها عبارتند از چای، قهوه، شکلات و غذاهایی که حاوی چربی باشد زیاد هستند. ممکن است حتی بوی عطر مورد علاقه شما باعث ایجاد تپوی شود.



علت:

در طول بارداری به دلیل تغییرات متابولیک و تغییرات هورمونی، شکایت تپوی و استفراغ مطرح می شود. شیوع آن در بارداری ۵۰٪ است. معمولاً بین اولین و دومین قاعده‌گی فراموش شده یعنی حدود ۴ هفته بارداری به دلیل تغییرات هورمونی استروژن و پروروژتررون و گناندوتروپین های کوریونی شروع شده و حدود هفتۀ ۱۶ تا ۱۷ پایان می یابد. جهت رفع آن می توان یک سری توصیه ها را ارائه داد. هر چند با این توصیه ها درمان کاملاً موفقیت آمیزی نیست ولی شدت ناراحتی مادر را کم می کند..

چند توصیه جهت بهبودی:

- خوردن سالاد و غذاهای سهل الهضم و میان وده های سبک به جای غذاهای سنگین



- خوردن نان خشک قبل بلند شدن از بستر خواب، چون کاهش قند خون خود یکی از علل تپوی و استفراغ است.



- پرهیز از بوهای محرك
- خوردن صبحانه نیم ساعت بعد از بیدار شدن از خواب
- ریزه خواری و خوردن چیزهای خشک نظیر: بیسکوئیت ترد و نان خشک در طول روز



- کاهش حجم مواد غذایی مصرف شده و افزایش تعداد دفعات تقدیمه
- نخوردن مایعات تا نیم ساعت بعد از غذا
- ورزش منظم و درمان دارویی (طبق دستور پزشک)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
بیمارستان پورسینا

تهوع و استفراغ بارداری



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی
با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :
nkums.ac.ir/category/15413

تایید گننده : خانم دکتر نصیری (متخصص زنان و زایمان)

مادر آگاه ، بارداری سالم ، نوزاد سالم



نکته :

ویار:

ویار تمایل به خوردن غذاهای عجیب و غریب نظیر نشاسته، برفک
یخچال، خاکرس و می باشد. به نظر می رسد کمبود آهن می
تواند در ایجاد این حالت مؤثر باشد.

در صورت ادامه داشتن یا شدید بودن تهوع و استفراغ و بهبود
نیافتن با توصیه های فوق پزشک شما را در بیمارستان بستری خواهد
کرد ..

روش های درمان در بیمارستان :

- ❖ مایع درمانی با استفاده از سرم
- ❖ استفاده از داروها طبق دستور پزشک
- ❖ دادن آرامش روحی و نداشتن استرس