




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) شهرستان بجنورد

برداشتن لوزه

تانسیلکتومی



تهیه و تنظیم :

لاله زار حسین زاده

(کارشناس مسئول سلامت همگانی)

پاییز ۱۳۹۶

آموزش های قبل از عمل :

- ✓ هنگام مراجعه به بیمارستان کلیه مدارک آزمایشات و تست شنوایی سنجی و غیره را همراه داشته باشید.
- ✓ عمل تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و حدود نیم ساعت طول می کشد.
- ✓ از ۸ ساعت قبل از عمل (از نیمه شب) ناشتا باشید.
- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل کلیه زیور آلات اجسام فلزی ، گیره سر ، لنز ، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.
- ✓ کلیه لباسها ، لباس زیر و جوراب و غیره را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.
- ✓ لاک ناخن و آرایش خود را پاک کنید.
- ✓ قبل از ورود به اتاق عمل ادرار کنید.

مراقبت های بعد از عمل :

- در قالب برگه مراقبتهای بعد از ترخیص به شما تحویل داده می شود
- سایت آموزش به بیمار :

www.nkums.ac.ir

بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ۰۵۸۳۱۵۱

علل عمل برداشتن لوزه سوم (آدنوئیدکتومی) :

- ✓ عفونت های چرکی مکرر لوزه سوم
- ✓ تنفس دهانی هنگام خواب
- ✓ عفونت مزمن گوش میانی که به علت بزرگی لوزه سوم باشد.
- ✓ وقفه تنفسی هنگام خواب
- ✓ اختلال در اکسیژن رسانی به سبب انسداد (بسته شدن) راه هوایی ناشی از بزرگی لوزه ها.
- ✓ اختلال در بلع یا گفتار
- ✓ اختلال در رشد استخوانهای فک و صورت
- ✓ سینوزیت مزمن بیش از ۳ تا ۵ بار به علت بزرگی لوزه سوم در بچه ها

جراحی لوزه :


برداشتن لوزه ها از داخل دهان انجام می شود.



در چه مواردی عمل برداشتن لوزه انجام می

شود:

- ✓ عفونتهای حاد چرکی تکرار شونده لوزه ها بیش از ۵ بار در سال که به درمان های داروئی جواب نمی دهد.
- ✓ هر عفونت با تب بالا در لوزه بچه ها که منجر به تشنج شود.
- ✓ بزرگی یک طرفه لوزه مشکوک به بدخیمی
- ✓ آبسه اطراف لوزه
- ✓ وقفه تنفسی هنگام خواب و تنفس بادهان باز در شبها
- ✓ بزرگی غیرطبیعی لوزه ها



(۳)

- برای تشخیص بزرگی لوزه سوم در صورت لزوم از عکس رادیولوژی کمک گرفته می شود. گاهی اوقات ، یک آبسه (تجمع چرک) در نزدیکی یک لوزه تشکیل می شود که به آن اصطلاحاً آبسه اطراف لوزه می گویند.
- اگر التهاب گلو و یا التهاب لوزه بر اثر یک عفونت استرپتوکوکی ایجاد شود، در صورت عدم درمان مناسب، بیماری به نام تب روماتیسمی ایجاد می گردد.
- به برداشتن لوزه، تانسلیکتومی و به برداشتن لوزه سوم، آدنوئیدکتومی می گویند. اگر جراحی ترکیبی از این دو باشد آدنوتانسلیکتومی می گویند.

علائم التهاب لوزه (تانسیلیت):

درد ، تب ، سوزش گلو و اشکال در بلع و قورت دادن است.

در التهاب لوزه سوم (آدنوئیدیت)

تنفس از دهان ، صحبت کردن غیرطبیعی ، سرماخوردگی مکرر ، تنفس بدبو و صدادار، گرفتگی بینی ، گوش درد ، عفونت مکرر گوش و ترشح از گوشها وجود دارد، که به ویژه در بچه ها باعث مشکلات گوش و گاهی کاهش شنوایی می شود.

(۲)

برداشتن لوزه (تانسیلیکتومی)

- برداشتن لوزه یک عمل شایع است که در کودکان و گاهی بالغین انجام می شود.
- لوزه ها در بالای گلو قرار داشته و در سنین کودکی به دفاع در مقابل حمله عفونت ها کمک می کند.
- لوزه ها قسمتی از سیستم لنفوی بدن هستند که در همکاری با بقیه اعضا در سیستم دفاعی بدن نقش ایفاء می کنند.
- آنچه مهم است این واقعیت است که برداشتن آنها باعث نقص در سیستم ایمنی نخواهد شد و بقیه اجزای این سیستم به طور جبرانی، نبود لوزه ها (آدنوئید) را پوشش می دهند.
- تورم و التهاب لوزه ها (تانسیلیت) در کودکان بسیار شایع می باشد. زیرا لوزه های آنها بزرگتر می باشد.
- لوزه ها با افزایش سن کودک به تدریج کوچکتر می گردند. التهاب گلو (فارانژیت) بیشتر در بزرگسالان دیده می شود.
- با این حال هم التهاب گلو و هم التهاب لوزه ها می تواند با یکدیگر در کودکان و بزرگسالان دیده شوند.
- لوزه سوم یا لوزه حلقی در قسمت عقب بینی قرار داشته، در معاینه معمولی دهان و حلق قابل روئت نیست. (۱)

(۱)