



دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی



۲۵ سوال رایج در رابطه با داروهای ضد تشنج



مهناز بنایی پرستار (دانشگاه علوم پزشکی
ایران)

میثم بابایی (فوق تخصص مغز و اعصاب
کودک و نوجوان
معاونت آموزشی)

والدین گرامی:

پزشک، با علم و آگاهی کامل نسبت به
عوارض داروهای ضد تشنج، درمان را آغاز
می کند، به نظر پزشک معالج احترام
بگذاریم.

برداستی از:

نلسون و

فینکل

شماره تماس:

نشانی:

ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -
معاونت آموزشی

۲۰) عارضه پوستی دارو چیست؟

معمولاً به صورت دانه های ریز قرمز رنگ قابل حس که
به سرعت منتشر شده و گاهی این ضایعات به یکدیگر
می چسبند.

۲۱) در صورت بروز عارضه پوستی ناشی از دارو در
کودک چه باید کرد؟

بایستی دارو زیر نظر پزشک قطع شود.

۲۲) ریزش مو عارضه شایع کدام دارو است؟

والپروات سدیم

۲۳) سکسکه عارضه کدام داروی ضد تشنج می باشد؟

اتوسوکسیماید

۲۴) کدام داروی ضد تشنج را بهتر است در بیماران
بیش فعال تجویز نکنیم؟

فنوباربیتال، خصوصاً در کودکان سنین مدرسه

۲۵) آیا رژیم غذایی خاصی در بیماران مصرف کننده
داروهای ضد تشنج توصیه می شود؟

معمولاً خیر در کودکانی که نیاز به مصرف داروی طولانی
دارند توصیه به مصرف شیر و لبنیات فراوان می شود.

۱) آیا میتوان ساعات مصرف دارو را جابه جا کرد؟

تا حد امکان بایستی دارو راس ساعت مصرف شود.

۲) آیا می توان قرص را خورد کرد و یا کوبید؟

خیر- زیرا اثر دارو کاهش می یابد.

۳) آیا می توان با معده خالی دارو را خورد؟

منعی ندارد مگر آنکه کودک اظهار ناراحتی کند.

۴) دارو باید قبل از غذا مصرف شود یا بعد از غذا؟

هر دو مورد منعی ندارد.

۵) آیا مصرف داروی خارجی بهتر است یا داروی

ایرانی؟

فرقی ندارد ولی بهتر است همیشه از یک کارخانه و

یک برند استفاده شود.

۶) آیا می توان دارو را خودسرانه قطع کرد؟

قطع ناگهانی دارو بسیار خطرناک است قطع دارو باید

با دستور پزشک باشد.

۷) آیا می توان در صورت ادامه دار شدن تشنجات

دارو را بدون اجازه پزشک زیاد کرد؟

افزایش دوز دارو فقط بایستی با نظارت پزشک معالج

باشد

۸) آیا می توان در صورت قطع تشنج، داروی کودک

را نداد؟

تشنج با مصرف دارو کنترل می شود و نباید از مصرف

دارو امتناع ورزید.

۹) آیا کودکی که دارو مصرف می کند نیاز به

آزمایش خاصی دارد؟

در حالت معمول خیر

۱۰) آیا نیاز به کنترل سطح خونی دارو در فواصل

زمانی مشخص وجود دارد؟

خیر

۱۱) در صورت فراموشی مصرف یک دوز دارو چه باید

کرد؟

هر زمان که به یاد آوردید دارو را مصرف کنید.

۱۲) در صورت استفراغ بعد از مصرف دارو چه باید

کرد؟

در صورت استفراغ تا ۳۰ دقیقه بعد از مصرف دارو باید

مجدد دارو داده شود ولی در غیراینصورت نیازی به

تکرار مصرف دارو نیست

۱۳) بیمار تشنجی (صرع) تا چه مدت باید دارو

مصرف کند؟

معمولاً دو سال، ولی گاهی با نظر پزشک این زمان

متغییر است.

۱۴) آیا می توان در زمان بروز تشنج جهت قطع حمله،

داروی خوراکی تجویز نمود؟

خیر هیچ دارویی در زمان تشنج نباید به صورت خوراکی

داده شود.

۱۵) مصرف دیازپام در حین تب در کودکان با تب و

تشنج تا چه مدت بایستی ادامه یابد؟

در هر دوره تب، تا زمان قطع کامل تب بایستی دیازپام

مصرف کرد.

۱۶) در صورت مصرف همزمان چند دارو، روش مصرف

چگونه است؟

بهتر است بین داروها فاصله باشد.

۱۷) آیا واکسیناسیون در کودکی که داروی ضد تشنج

می خورد ممنوع است؟

در اکثریت موارد واکسیناسیون منعی ندارد. مگر موارد

خاص که توسط پزشک مشخص می شود.

۱۸) عوارض شایع داروهای ضد تشنج چیست؟

در شروع مصرف عوارضی چون خواب آلودگی، گیجی و

عدم تعادل و سرگیجه، پیش فعالی، تهوع، سردرد،

پرخاشگری، افزایش و کاهش وزن دیده می شود که گذرا

می باشد.

۱۹) عوارض پوستی با کدام داروها شایع تر است؟

فنی توئین، فنوباربیتال، کاربامازپین، اکس کار بازپین،

لاموتریژین