


سل از چه راهی افراد را درگیر می کند؟

راه اصلی ، استنشاق ترشحات یا غبار آلوده به باکتری سل است. که ناشی از تماس با فرد سلی درمان نشده است.

سل با قطره های ریز موجود در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.

در تماس کوتاه و گذرا امکان انتقال به فرد دیگر کم است.

بسیاری از مردم میکروب سل را در بدن خود دارند اما به بیماری سل مبتلا نیستند.



علائم بیمار

سل اولیه معمولاً بدون علامت است در موارد شدید تر حملات سرفه و دیده شدن خون در خلط



۱) سرفه خشک بیش از ۲ هفته

۲) تب و عرق شبانه

۳) بی اشتها

۴) خلط فراوان

۵) خلط خونی

۶) درد قفسه سینه

سل چه طور قابل تشخیص است ؟

یک تست پوستی در محل بازو انجام می شود که بعد از ۴۸-۷۲ ساعت پزشک واکنش بدن به تست را بررسی می کند

درمان

دوره درمان و تعداد داروها بسته به شدت بیماری و قسمت درگیر شده فرق می کند.

طول درمان ۶ ماه تا ۲ سال است.

عدم مصرف درست و یا قطع دارو توسط بیمار ، وی را مجدداً بیمار نموده و احتمال انتقال بیماری را به فرد دیگر زیاد می کند.

عوارض داروهای ضد سل

زرد شدن چشم

دل درد

تهوع و استفراغ

تاری دید

نارنجی رنگ شدن ادرار

وزوز گوش

اگر این علائم مشاهده شد باید با مشورت پزشک دارو قطع شود.



دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی
خراسان شمالی

نام بیمار:
نام پرستار:
نام پزشک:

کد: ۳۸
سطح: ۹

سل چیست؟

بیماری سل ، عفونی است مدت زیادی طول
می کشد . سل اغلب ریه را در
گیر می کند.



گروه مخاطب: بیماران

واحد آموزش به بیمارستان امام رضا (ع)

تحت نظارت: خاتم آرین

۱۳۹۳

شرایط اتاق بیمار

نور خورشید به میزان کافی به اتاق نفوذ
کند.

به اندازه کافی پنجره داشته باشد.

پنجره اتاق بیمار بسته نشود.



منبع:

www.help.tums.ac.ir

بیمارستان امام رضا (ع)

۰۵۸۲-۲۲۲۸۱۱۱-۸

www.nkums.ac.ir

پیشگیری

راه مبارزه با سل ، شناختن افراد بیمار
و درمان سریع با داروی ضد سل است.

پیدا کردن افراد آلوده که هنوز به سل مبتلا
نشده اند.

زدن واکسن ب ت ژ

با لا بردن سطح آموزش بهداشت و سطح
اقتصادی و فرهنگی در مردم

مبارزه با بیماری ایدز چون موج جدید از
سل را به همراه دارد.

بیمار حتما از ماسک استفاده کند.

دو هفته بعد از شروع درمان و مصرف
دارو ، بیماری به فرد دیگر منتقل نمی
شود.

بیمار باید از بوسیدن کودک خود داری
کند.

از اینکه خلط در هوا پخش شود پرهیز
شود.