

۴- محل تزریق را با پنبه الکل تمیز کرده  
و اجازه دهید خشک شود.

۵- سرپوش سرسوزن را با احتیاط بردارید.



۶- تمام طول سوزن را به طور عمودی  
(۹۰ درجه) در پوست خود وارد کنید.

## مراحل تزریق:

۱- دست های خود را با آب و صابون  
بشوید، سپس خشک کنید.



۲- در وضعیت راحت طوری بشینید یا  
دراز بکشید تا بتوانید ناحیه شکم را ببینید.



۳- ناحیه ای در سمت راست یا چپ ناف که  
حداقل ۵ سانتی متر از ناف فاصله داشته و به  
طرف پهلوها باشد را انتخاب کنید.



## سلکسان

در اثر بی تحرکی و شکستگی استخوان های  
لگن و ران احتمال لخته شدن خون در رگ های  
عمقی پاها افزایش می یابد.

با استفاده از این راهنما قادر خواهید بود خودتان  
داروی سلکسان را به روش صحیح تزریق  
نمایید.

دارو کشیده شده از داروخانه تحویل شما  
می گردد.

دارو را هر روز در ساعت معین تزریق کنید.





دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

نام بیمار:

نام پرستار:

نام پزشک:

کد: ۳

سطح: ۶

## سلکسان



گروه مخاطب: بیماران

تهیه کننده: گل بهار گری

زیر نظر: خانم آرین

زمستان ۱۳۹۳

## نکته:

نباید تزریق را در نزدیکی محل جراحی انجام داد.

اگر قسمتی از پوست به علت جای زخم قبلی، سفت شده است تزریق باید حداقل سه سانتی متر از آن دور باشد و مراقب باشید که محل تزریق ۵ سانتی متر باناف فاصله داشته باشد.

ارجع به پزشک در صورت بروز موارد زیر:

خون ریزی از لته و بینی

وجود خون در ادرار و مدفوع

استفراغ خونی

تنگی نفس

منبع فعال:

<http://www.iranorthoped.ir>

۷- بانگشت شصت خود انتهای سرنگ را به سمت پایین فشار دهید تا سرنگ خالی شود.

۸- سوزن را به طور مستقیم خارج کرده و آن را داخل محفظه ایمن بیندازید.

## محل های تزریق آمپول سلکسان:

