



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

راهنمای استفاده از داروی ضد انعقاد

(وارفارین)



گروه مخاطب : بیماران

تهیه کننده: گل بهار گری

تحت نظارت: خانم حسینی

پاییز ۱۳۹۳

آموزش بیمار:

به منظور پیشگیری از خون ریزی لته ها از مسواک نرم استفاده کنید.

در صورت بروز هر یک از نشانه های زیر،

فورا به پزشک مراجعه کنید:

غش، سرگیجه، یاتشدیدضعف

سردرد درد شدید شکم

ادرار قرمز یا قهوه ای رنگ

مدفوع قرمز یا سیاه

هرگونه خون ریزی غیر معمول از هر قسمت بدن

منابع:

در سنامه داخلی-جراحی قلب و عروق

برونر سودارت

کتاب داروهای ژنریک

تداخلات:

مصرف مقادیر زیاد غذاهای حاوی ویتامین K اثرات این دارو را مهار می کند.

مصرف همزمان داروهای ضد حاملگی خوراکی حاوی استروژن و پروژسترون یا باربیتورات ها پاسخ بدن نسبت به اثرات ضد انعقادی این دارو را کم می کند.



وارفارین

طبقه بندی دارویی:

مشتق کومارین

طبقه بندی درمانی:

ضدانعقاد

اشکال دارویی: Scored.Tab;5mg

مکانیسم اثر:

این دارو فاکتورهای انعقادی X,IX,VII,II

که وابسته به ویتامین K هستند را مهار

می کند.

معمولا جذب گوارشی کاملی دارد.

نیمه عمر این دارو ۱-۳ روز است.

دفع از راه ادرار است.

موارد مصرف:

ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریوی

پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب

دریچه مصنوعی قلب

انفارکتوس میوکارد

دیس ریتمی دهلیزی

رماتیسم قلبی

موارد عدم مصرف:

خون ریزی فعال

زخم گوارشی

پس از اعمال جراحی مغز، نخاع و چشم

کمبود ویتامین K

افزایش فشار خون کنترل نشده

بیماری شدید کبدی و کلیوی

حاملگی

سرطان های احشایی

عوارض جانبی:

خون ریزی رحمی

ریزش مو

اسهال

تهوع و استفراغ

تیره شدن انگشتان

راش و کهیر

سوزش پاها

هشدار:

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط

مصرف شود:

دیابت شدید

نارسایی کبد و کلیه

کمبود ویتامین C و K

