

تعريف:

اختلال وسوسی - جبری به دو شکل وسوس فکری و وسوس عملی بروز می کند . افکار وسوسی یک عقیده ، احساس یا فکر مزاحم ، ناخواسته و تکراری است که اگر فرد آن را نادیده بگیرد دچار اضطراب می شود . عمل وسوسی یک رفتار اجباری و تکراری است که به دنبال فکر وسوسی و برای کاهش اضطراب فرد بروز می کند .

ویژگی های وسوس فکری و عملی :

- ❖ هر دو مصرانه و مدام به ذهن شخص وارد می شود
- ❖ احساس اضطراب و ترس
- ❖ از نظر فرد بیمار چیزی ناخواسته ، نامقبول و غیرقابل کنترل است
- ❖ خود شخص به حالت غیر عادی و بیهودگی افکار و اعمال وسوسی آگاه است
- ❖ شخص میل شدیدی برای مقاومت در مقابل این افکار و اعمال احساس می کند اما در صورت مقاومت ، اضطراب او افزایش می یابد .



انواع وسوس :

- ❖ **وسوس آلودگی :** منجر به شستشوی مکرر می شود یا فرد از آن دوری می کند .
- ❖ **وسوس شک و تردید :** اقدام به بررسی و وارسی مکرر مانند بستن شیر گاز یا قفل کردن در افکار مزاحم بدون اعمال وسوسی : به صورت کلمات ناخوشایند ، زشت یا کفر آمیز مثلاً این فکر به ذهن بیمار هجوم می آورد که به دیگران حرفهای زشت بزنند .
- ❖ **وسوس دقت و قرینگی :** موجب می شود که فرد ساعت ها صرف اصلاح صورت و قرینه بودن بکند .
- ❖ **وسوس شمارش :** میل غیر قابل مقاومت برای شمردن هر چیزی مانند آجرها یا صندلی ها
- ❖ **وسوس کندن مو :**
- ❖ **تصورات وسوسی :** مثلاً تصویر ذهنی کشته شدن کودکان که مکرر به ذهن فرد می آید .
- ❖ **اعتقادات وسوسی :** مثلاً اگر فکر کنم که بچه ام مریض است ، موجب مرگ او خواهد شد .

درمان :

- دارو درمانی : (موثرترین داروها فلوکستین و کلومپرامین هستند)
 - رفتار درمانی
- ترکیب رفتار درمانی و دارو درمانی نتیجه بهتری به همراه دارد . خانواده درمانی و گروه درمانی و روان درمانی های حمایتی بسیار مفید و موثر هستند .

آموزش به بیمار و خانواده :

بهبود مستلزم تلاش زیاد است . روند درمانی این اختلال طولانی است و نیازمند استمرار و مداومت است .

رفتار درمانی نیازمند :

همکاری نزدیک ، تمرین روزانه و صبر و تحمل است .

✓ از روش هایی که روان درمانگ برای درمان شما در نظر می گیرد استقبال کنید و همکاری لازم با وی داشته باشد .

✓ تا حد امکان از موقعیت های استرس زا دوری کنید .

✓ خانواده باید بداند که افکار و اعمال وسوسی خارج از کنترل فرد و خارج از شخصیت بیمار است .



بیمارستان امام رضا (ع)
شهرستان بجنورد



احتلال وسوسی - جبری (OCD)

تهیه کننده: الهه صابر

با نظرارت: دکتر مهدیه ارشاد
(متخصص اعصاب و روان)

اردیبهشت ۱۴۰۲



نکنید ، دفعات شستشو را نشمرید ، از قبول انجام تکراری مثل عوض کردن مکرر لباس خودداری کنید.
✓ با بیمار قرار بگذارید که به سوال هایی از قبیل آیا اجاق گاز را خاموش کردم ؟ آیا شیر را بستم ؟ پاسخ نمی دهید و این قرار را یادآوری کنید .

✓ به جای بیمار تصمیم نگیرید بلکه او را در تصمیم گیری کمک کنید .
✓ در صورت ظهر علائم جدید و یا عود بیماری به پزشک مراجعه نمایید .

✓ بیماران نباید بار درمان را به تنها بی به دوش بکشند .
اطمینان از جانب افراد مورد اعتماد ، موفقیت در درمان را افزایش میدهد .

✓ در مورد اختلال وسوس آگاهی بیشتری کسب کنید ، با این کار پشتیبانی و درک و حمایت از بیمار آسانتر می شود بدانید که بیمار مبتلا به وسوس علاوه بر اضطراب از علائم افسردگی ، مشکل در خواب ، کاهش میل جنسی و حتی افکار خودکشی رنج می برند .
✓ به بیمار اطمینان دهید که از او حمایت می کنید و همراه او هستید .

✓ جهت ترک اعمال وسوسی بیمار را تحت فشار قرار ندهید .

✓ هر موفقیت کوچک در راه درمان را تشویق کنید .
✓ بیمار برای کاهش اضطراب رفتارهای تکراری انجام می دهد که خودش از آنها بیزار است ، بنابراین از قضاوت سرزنش و مسخره نمودن فرد مبتلا و القای احساس گناه به او خودداری کنید .

✓ از مشارکت در اعمال تکراری بیمار خودداری کنید .
مثلا در انجام وارسی مکرر در و پنجه با بیمار همکاری

نشانی: بجنورد بیمارستان آمام رضا (ع)

تلفن: ۰۸۵۳۲۲۸۱۱۱-۸

داخلی ۲۱۷

پایگاه اینترنتی: www.nkums.ac.ir